



Source : Field

MERE-LOCHE - LOCHE RONDE

Epinephelus malabaricus (Bloch et Schneider, 1801)

Famille : Epinephelidés (loches)



COMMENT LA RECONNAITRE ?

Elle se distingue par :

- un corps massif et cylindrique,
- une tête et un corps brunâtres à gris, avec des points blancs disséminés,
- de nombreux petits points noirs légèrement plus gros et nombreux sur la tête que sur le reste du corps,

- des nageoires en général avec des petits points noirs.

SA TAILLE ET SON POIDS

Taille moyenne : entre 70 cm et 1,10 m.

Taille Max : plus de 1,20 m.

Poids max : plus de 25 kg.



QUE MANGE-T-ELLE ?

Elle est **carnivore***. Elle se nourrit surtout de poissons, de crustacés mais aussi de céphalopodes.

Comme les autres loches, elle se nourrit à la tombée de la nuit.



JUSQU'À QUEL AGE PEUT-ELLE VIVRE ?

On ne le sait pas.

COMMENT SE REPRODUIT-ELLE ?


Elle est **hermaphrodite***. Elle est d'abord femelle puis devient mâle.

Les mères-loches se rassemblent pour se reproduire dans les passes (sur l'Aiguille de Prony également). La ponte a lieu entre octobre et mi-décembre.

COMMENT VIT-ELLE ?

Les plus grands individus sont fréquemment accompagnés par des petites carangues jaunes et noires (*Gnathanodon speciosus*).

Comportement social : elle est solitaire, parfois observée en petits groupes de 2 à 5 individus.



OU VIT-ELLE ?

Indo-Pacifique : de la Mer Rouge jusqu'aux îles Tonga et du sud du Japon au sud de l'Australie.

Nouvelle-Calédonie : sur l'ensemble du Territoire, mais elle est plus abondante sur les récifs isolés, spécialement dans le Nord.

Biotores : les juvéniles habitent dans les zones littorales et les estuaires.

Les adultes vivent dans des habitats variés, des eaux côtières jusqu'à la pente externe. Ils préfèrent les fonds des estuaires, les sorties de rivière et les zones de mangrove.

Domaines de profondeur : en général à moins de 150m, parfois jusqu'à 300 m.

POURQUOI EST-ELLE PECHEE ?

La mère-loche est recherchée par les pêcheurs professionnels. En Nouvelle-Calédonie, elle est fréquente sur le marché de Nouméa.

Elle est souvent capturée lors des concentrations de reproduction.

Elle est une des cibles préférées de la chasse sous-marine. Sa capture, bien que spectaculaire, ne représente guère un exploit car elle est peu farouche.



COMMENT EST-ELLE PECHEE ?

Engins : surtout à la ligne et au fusil sous-marin, mais aussi à la nasse et occasionnellement au chalut.

EST-ELLE EN DANGER ?

Monde : elle n'est pas répertoriée comme espèce menacée. Elle est la cible de tout type de pêcheurs, ce qui pourrait la rendre vulnérable.

Nouvelle-Calédonie : elle était autrefois abondante dans la plupart des eaux de Nouvelle-Calédonie. Elle est encore fréquente dans quelques zones reculées de la Province Nord, mais dans le lagon sud-ouest, elle est devenue rare. Ces loches sont très vulnérables pendant la



reproduction, car elles se rassemblent en groupes importants.

ATTENTION !

Les gros individus sont souvent **ciguatoxiques*** et leur chair est de qualité moyenne.

Les plus grosses mères-loches peuvent être agressives et des cas de morsures ont été rapportés.



Source : Randall