



Source : Randall

## PICOT RAYÉ

*Siganus lineatus* (Valenciennes, 1835)

Famille : Siganidés



### COMMENT LE RECONNAÎTRE ?

Il est bleu-gris. Son corps et sa tête sont recouverts de fines bandes ondulées jaune orangé. Il a une marque jaune vif au moins aussi grosse que son œil à la base de sa queue.



### SA TAILLE ET SON POIDS

**Taille et poids moyens :** entre 20 et 33 cm pour un poids de 200 à 800 g. Sur les onze espèces de picots en Nouvelle-Calédonie, le picot rayé est le plus grand.  
**Taille et poids max :** 43 cm pour un poids de 1,7 kg.



### QUE MANGE-T-IL ?

Il aime particulièrement les épiphytes (les petites algues qui poussent à la surface d'algues plus grandes). Il possède des dents soudées en forme de peigne qui lui permettent de les racler. Il mange aussi des phanérogames (plantes formant les herbiers) et des algues assez dures. Il consomme des petits animaux invertébrés à l'occasion.

### JUSQU'À QUEL ÂGE PEUT-IL VIVRE ?

On ne le sait pas.

### COMMENT SE REPRODUIT-IL ?


La reproduction a lieu essentiellement de fin décembre à début mars. Durant cette période, de grands rassemblements de plusieurs milliers de picots rayés ont été observés.

### COMMENT VIT-IL ?

Comme tous les poissons herbivores, il a une activité uniquement diurne. Il est assez craintif et les gros picots rayés sont souvent difficiles à approcher.

**Comportement social :** il vit en général en bancs de taille moyenne. Ces bancs peuvent rester plusieurs mois dans une même zone. Les gros picots rayés se rencontrent rarement en grands bancs (plus de 20 individus). Parfois le picot rayé nage avec le picot argenté ou le picot gris.

**Migration :** les picots rayés montent sur les platiers avec la marée haute. Des migrations ont été observées durant la période de reproduction.



## OÙ VIT-IL ?

**Indo-Pacifique** : Maldives, Inde, Sri Lanka, Ogasawara (Japon), Indonésie, Nouvelle-Guinée, Australie, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie et Philippines.

**Nouvelle-Calédonie** : partout sauf apparemment aux Loyautés et aux Chesterfield.

**Biotores** : les jeunes habitent les mangroves, les herbiers et les algueraias proches de la côte. Les adultes vivent dans l'ensemble du lagon, de la limite des eaux douces jusqu'aux passes si celles-ci sont proches du rivage. Avec la marée il monte se nourrir sur les platiers et les herbiers.

**Profondeur** : de 2 à 20 m.

## POURQUOI EST-IL PÊCHÉ ?

Sa chair est excellente et le picot rayé est recherché par les pêcheurs au filet. Il est vendu sur le marché de Nouméa, sauf durant les mois de septembre à janvier. Des essais d'élevage sont étudiés en Nouvelle-Calédonie.



## COMMENT EST-IL PÊCHÉ ?

**Engins** : fusil sous-marin, senne, épervier, filets maillants, pièges à poisson, nasses.

**Méthodes** : ce poisson se pêche essentiellement au filet. Contrairement au picot gris (*S. fuscescens*), le picot rayé est rarement capturé à la canne à pêche. En chasse sous-marine, il est souvent très méfiant et ne se laisse pas facilement piquer.

## EST-IL EN DANGER ?

**Monde** : il y a assez peu d'informations à ce sujet.

**Nouvelle-Calédonie** : la population de picots rayés a beaucoup diminué parce qu'ils ont été trop pêchés. Les picots de plus de 30 cm sont rares.

## ATTENTION !

Le picot rayé peut infliger de douloureuses blessures avec ses épines. Si besoin, il faut mettre la partie atteinte dans de l'eau très chaude pour soulager la douleur. Le picot rayé est parfois ciguatoxique, mais assez rarement.



Source : Randall